

MÉDICO ESPECIALISTA – PSQUIATRA

1. Assinale, nas alternativas abaixo, aquela em que pelo menos uma palavra contém erro de grafia:
- Espectro – excitação – análise – realização.
 - Desprezo – ascensorista – miscigenação – extravagante.
 - Sintaxe – recrudescer – expectativa – contexto.
 - Iracível – ascensão – expansão – concessão.
2. Leia atentamente as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.
- O privilégio garantido ao cabelereiro obcecado por maisena foi incompreensível.
 - A contenção da paralização pelo insolente policial foi um ato de desprezo.
 - Estava tão entuziasmada com as pesquisas que realizou, que nem se deu conta do cansaço.
- I, II e III não apresentam erros de origem ortográfica.
 - Apenas II apresenta erro de origem ortográfica.
 - Apenas I e III apresentam erros de origem ortográfica.
 - I, II e III apresentam erros de origem ortográfica.
3. Analise as assertivas abaixo acerca da concordância:
- Sempre houve um motivo para ela implicar com minhas finanças.
 - Se os acionistas hesitassem em assinar o acordo, perderiam milhões.
 - Não se atribuirá às empregadas a culpa do assalto.
- Somente II está correta.
 - Somente III está correta.
 - Somente I e II estão corretas.
 - Somente I, II e III estão corretas.
- Analise um fragmento do texto abaixo e responda as questões 4, 5 e 6:
- "(...) A cultura do hedonismo e do consumo está dando os primeiros passos na Índia. Os cirurgiões plásticos são bastante requisitados, mas com discrição; o Botox foi liberado para uso cosmético apenas em meados de maio. À mesa, o vinho é um hábito que está sendo rapidamente adquirido pelas classes emergentes. (...)" (Revista Veja, 07/06/2006).**
4. Analisando o texto, hedonismo é:
- Cultura do prazer imediato.
 - Cultura que mostra a importância do desenvolvimento sustentável.
 - Cultura que privilegia a espiritualidade.
 - Cultura que impõe a importância dos vícios.
5. Na oração *Os cirurgiões plásticos são bastante requisitados*, o termo sublinhado é:
- Adjunto adnominal.
 - Adjunto adverbial.
 - Aposto.
 - Vocativo.
6. A oração sublinhada no texto é:
- Oração coordenada sindética causal.
 - Oração coordenada sindética adversativa.
 - Oração coordenada sindética conclusiva.
 - Oração coordenada sindética aditiva.
7. A figura de linguagem sublinhada abaixo é:
- "E rir meu riso e derramar meu pranto Ao seu pesar ou seu contentamento" (Vinícius de Moraes).**
- Metáfora.
 - Antítese.
 - Sinestesia.
 - Pleonasma.
8. A obra "*Verônica decide morrer*" é autoria de:
- Paulo Coelho.
 - Cecília Meirelles.
 - Jorge Amado.
 - Luís Fernando Veríssimo.
9. Complete as lacunas abaixo com o verbo correspondente e assinale a alternativa correta:
- Se _____ brigadeiros, cada um dos convidados _____ os bolsos.**
- Ouver – encherà.
 - Houver – encherà.
 - Ouver – encherão.
 - Houver – encheram.
10. O antônimo da palavra "*mesquinhez*" é:
- Avareza.
 - Gratidão.
 - Generosidade.
 - Ganância.
11. Um grupo de 30 pessoas apresenta a composição: 12 homens e 18 mulheres; 10 casados e 20 solteiros; 15 italianos e 15 brasileiros. Determine a probabilidade de que uma pessoa escolhida ao acaso, seja um homem solteiro e brasileiro.
- $\frac{1}{30}$.
 - $\frac{2}{3}$.
 - $\frac{1}{15}$.
 - $\frac{2}{15}$.
12. Um artigo é vendido em uma loja por R\$ 215,00. Sobre esse preço são dados dois abatimentos sucessivos: um de 16% e outro de **p**%. Se o preço de tal artigo passou a ser R\$ 135,45, então **p** é igual a:
- 21%.
 - 28%.
 - 25%.
 - 27%.
13. Um hexágono regular tem lados medindo 7 cm. Calcule a diferença entre o comprimento da circunferência circunscrita e o perímetro desse hexágono. (Use $\pi = 3,14$).
- 8,15 cm.
 - 1,96 cm.
 - 1,24 cm.
 - 6,48 cm.
14. Para um grupo de funcionários, uma empresa oferece cursos para somente dois idiomas estrangeiros: inglês e espanhol. Há 120 funcionários que pretendem estudar inglês, 180 que preferem espanhol e 60 que pretendem estudar simultaneamente os dois idiomas. Se $\frac{1}{5}$ do total de funcionários desse grupo não pretende estudar qualquer idioma estrangeiro, então o número de elementos do grupo é:
- 300.
 - 280.
 - 240.
 - 320.

15. Um bloco retangular tem dimensões 3x, 5x e 4x (em centímetros) e a área total de suas faces é igual a 376 cm². O seu volume é:
- 520 cm³.
 - 480 cm³.
 - 360 cm³.
 - 240 cm³.

16. Como consequência da Revolução Constitucionalista, ocorrida em 1932, onde as elites paulistas desejavam a autonomia do Estado, o fim do governo Provisório e a realização de novas eleições presidenciais, uma nova Constituição começou a ser elaborada, sendo promulgada em 1934. Dentre as alternativas abaixo, qual não dispõe uma das inovações trazidas pela nova Carta?
- Os três poderes Executivo, Legislativo e Judiciário tornaram-se dependentes entre si.
 - O Brasil tornou-se uma República Federativa.
 - Introduziu-se o voto feminino.
 - O ensino primário, gratuito e obrigatório foi estabelecido.

17. Sobre o fascismo italiano pode-se afirmar:
- Fundamentava-se no culto à violência e ao militarismo, uma vez que o intuito não era convencer o inimigo a se aliar, e sim eliminá-lo.
 - Benito Mussolini, o criador do Estado fascista, impôs um regime severo sobre a economia com o intuito de autossuficiência para a Itália.
 - Um dos pilares era o anticomunismo, repreendendo, através da violência excessiva, as idéias revolucionárias e dissidentes.
- Todas estão corretas.
 - Somente I e II estão corretas.
 - Somente I e III estão corretas.
 - Somente II está correta.

18. *Tem suas nascentes situadas em território peruano, na cordilheira dos Andes, mas grande parte de suas águas atravessa o Brasil. Cruza também o território da Guiana Francesa, Guiana, Suriname, Venezuela, Colômbia, Equador e Bolívia. Além de ser a maior Bacia do mundo, apresenta o maior rio em extensão e volume de água, e na foz deste, apresenta a maior ilha fluviomarina do planeta, a ilha do Marajó.* Trata-se da Bacia:
- Amazônica.
 - Do São Francisco.
 - Do Tocantins - Araguaia.
 - Do Uruguai.

19. Qual das alternativas abaixo não diz respeito ao Japão?
- Possui abundância de recursos naturais devido ao relevo plano.
 - A maior metrópole do Japão é Tóquio.
 - O crescimento da população japonesa atualmente é pequeno, devido ao controle de natalidade que vem sendo realizado.
 - A população tem nível educacional muito alto e a taxa de analfabetismo é uma das menores do mundo.

20. De acordo com investigações da Polícia Federal, divulgadas pela imprensa em março de 2009, diretores de uma grande empreiteira paulista praticavam evasão de divisas e faziam doações ilegais a políticos. Trata-se da:
- MZM.
 - Camargo Corrêa.
 - Odebrecht.
 - Andrade Gutierrez.

Observe as drogas listadas abaixo:

- Cocaína.**
- Maconha.**
- Anfetamina.**
- LSD.**
- Álcool.**
- Ecstasy.**
- Psilocibina (cogumelo)**
- Mescalina.**
- DMT.**
- Opióides.**
- Benzodiazepínicos.**
- Quetamina.**
- Cafeína.**
- GHB ("ecstasy líquido").**

Com base nesta listagem, responda as questões de 21 a 30:

21. São drogas estimulantes:

- I, III e VIII.
- III, VI e XII.
- I, III e XIII.
- VI, VIII e XIII.

22. São drogas alucinógenas:

- IV, VII e IX.
- II, VI e X.
- II, IV e XII.
- I, II e III.

23. São drogas depressoras:

- II, V e XI.
- V, XI e XIV.
- X, XII e XIV.
- V, VII e IX.

24. Tem como principio ativo o MDMA:

- VI.
- XII.
- XIV.
- VII.

25. Seu uso comumente associa-se a comportamentos extremos agressivos e inadaptados:

- I.
- II.
- X.
- XIV.

26. São sinais e sintomas comuns na abstinência alcoólica, exceto:

- Tremor.
- Nistagmo.
- Insônia.
- Delirium.

27. Tem como principal ação farmacológica o bloqueio na recaptação dos neurotransmissores catecolaminérgicos norepinefrina e dopamina. Trata-se:

- I.
- VI.
- XII.
- XIV.

28. Esta substância é produzida a partir do seu precursor que é um solvente encontrado em produtos de limpeza do chão, verniz para unhas, entre outros.

- IV.
- VIII.
- IX.
- XIV.

29. Das drogas listadas abaixo, tem maior poder adictogênico:
- III.
 - V.
 - X.
 - XII.
30. Habitualmente o tratamento da síndrome de abstinência desta droga é tratada utilizando-se diazepam, 10-20 mg/ 1-2 h (dosagem típica necessária 60 mg). Trata-se de:
- I.
 - V.
 - X.
 - XI.
31. São fatores de risco para o transtorno depressivo maior, exceto:
- História familiar de alcoolismo.
 - Pós-parto.
 - Menopausa.
 - Falta de relacionamentos íntimos.
32. O aspecto central para o conceito de síndrome de dependência é:
- Prioridade da busca da droga sobre outros comportamentos na manutenção do uso disfuncional da droga.
 - Desenvolvimento de tolerância a substância, fazendo com que o usuário se utilize de doses cada vez mais elevadas para atingir o efeito desejado.
 - Desenvolvimento de síndrome de abstinência com a retirada da substância.
 - Diminuição do repertório.
33. Dentre os achados clínicos listados abaixo, assinale o mais freqüente no transtorno depressivo maior:
- Mudanças no apetite.
 - Mudanças no sono.
 - Mudanças na atividade corporal.
 - Ideação suicida.
34. São agentes medicamentosos que podem induzir um quadro depressivo, exceto:
- Ampicilina.
 - Propranolol.
 - Contraceptivos orais.
 - Anticonvulsivantes.
35. Acarreta em maior risco de suicídio:
- Depressão pós-gravidez.
 - Depressão superposta a um transtorno de personalidade.
 - Depressão com traços psicóticos.
 - Depressão com traços catatônicos.
36. Representa uma indicação secundária quanto ao uso de antidepressivos:
- Transtorno depressivo maior.
 - Distímia.
 - Transtorno do pânico.
 - Transtorno de ansiedade generalizada.
37. Dentre seus mecanismos de ação, age como antagonista histamínico (H_1):
- IMAOs.
 - Amitriptilina.
 - Tricíclicos.
 - Fluoxetina.
38. Tem como efeitos colaterais ativação psicomotora, insônia, ansiedade, agravamento de quadros psicóticos e potenciação dos agentes antiparkinsonianos:
- IMAOs.
 - Tricíclicos.
 - Bupropiona.
 - Fluoxetina.
39. São drogas que devem ser evitadas em quaisquer circunstâncias, se o paciente estiver sendo tratado com um IMAO, exceto:
- Inalantes para asma (inalantes com esteróides puro são seguros).
 - Fluoxetina.
 - Dopamina.
 - Efedrina.
40. São medicamentos que podem induzir à mania ou à hipomania, exceto:
- Broncodilatadores.
 - Antidepressivos tricíclicos.
 - Cimetidina.
 - Barbitúricos.
41. Sobre as indicações e efeitos da terapia com o lítio, assinale a alternativa incorreta:
- É útil para potencializar o efeito dos antidepressivos.
 - Útil no manejo do controle dos transtornos do impulso (especialmente violência episódica).
 - Para o manejo do episódio depressivo agudo no paciente bipolar.
 - Útil na prevenção de episódios maníacos no paciente bipolar.
42. São efeitos colaterais observados em um paciente com uma litemi $> 3,0$ mmol/l:
- Tremor fino, náusea.
 - Ataxia, confusão.
 - Disartria, tremor grosseiro.
 - Delírio, convulsão, coma, morte.
43. Caracteriza-se por períodos de depressão que se alternam com períodos de hipomania. As mudanças de humor tendem a ser irregulares e abruptas, às vezes ocorrendo dentro de horas uma da outra. Trata-se:
- Transtorno bipolar I.
 - Transtorno bipolar II.
 - Transtorno ciclotímico.
 - Transtorno de personalidade borderline.
44. Caracteriza-se por ataques recorrentes, espontâneos e inesperados de ansiedade, com um início rápido e de curta duração.
- Transtorno de ansiedade generalizada.
 - Transtorno do pânico.
 - Transtorno de estresse agudo.
 - Fobia social.
45. A capsulotomia anterior é uma neurocirurgia indicada em casos extremos de:
- TOC.
 - Transtorno bipolar.
 - Esquizofrenia.
 - Personalidade anti-social.
46. Tem como característica central os delírios e alucinações auditivas. Trata-se da esquizofrenia do tipo:
- Paranóide.
 - Desorganizado.
 - Residual.
 - Catatônico.
47. Além de crenças estranhas, experiências perceptivas fora do comum, o foco deste tipo de esquizofrenia reside nos sintomas negativos. Trata-se:
- Paranóide.
 - Desorganizado.
 - Residual.
 - Catatônico.

48. São fenotiazinas, exceto:

- a) Amplictil.
- b) Flufenan.
- c) Navane.
- d) Serentil.

49. É um neurolépticos atípico:

- a) Olanzapina.
- b) Perfenazina.
- c) Clorpromazina.
- d) Pimozida.

50. É a única droga antipsicótica que demonstrou ser efetiva em reduzir os sintomas positivos e negativos em pacientes que não respondem aos neurolépticos típicos:

- a) Clozapina.
- b) Risperidona.
- c) Ziprazidona.
- d) Pimozida.